

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat vastagbél tükrözéshez

Betegtájékoztató

Mi a vastagbéltükrözés/kolonoszkópia?

A vastagbél tükrözés jelenleg a legkorszerűbb vizsgálati módszer a végbélben, a vastagbélben és a vékonybél utolsó 10-20 cm-es szakaszában megjelenő betegségek (gyulladás, fekély, daganat) kórismézéséhez. Emellett számos esetben gyógyító beavatkozásra is lehetőség van, pl. jóindulatú daganat (polyp) levételére vagy ritkábban vérzéscsillapításra, szűkületek tágítására.

Hogyan kell felkészülni a vizsgálatra?

Csak tiszta vastagbél vizsgálható, így a megfelelő előkészítés elengedhetetlen feltétele a sikeres vizsgálatnak. A vizsgálatot megelőző napon történik a vastagbél tisztítása hashajtó oldattal (Endostar, G-oldat, colonsteril por). Kérjük pontosan kövesse az előkészítőkhöz mellékelt betegtájékoztatót! Étrendi megszorítások is szükségesek a vizsgálatot megelőző 10 nappal már rostos, nehezen emészthető, magas ételeket ne fogyasszon!

Az alábbi étrend tartása javasolt a vizsgálat előtti napon: Reggelire ehetsz egy könnyű reggelit, reggeli gyógyszereit vedd be, és másnap, amíg a vizsgálatot meg nem csináltuk, étkeznie nem szabad, csak folyadékot fogyaszthatsz! Az előírt hashajtót vízzel vagy teával hígítani kell és kb. 1,5-2 óra alatt el kell fogyasztani. Az elfogyasztás után rövid időn belül erős hashajtás következik. Emellett annyi folyadékot fogyasszon a nap folyamán, amennyit csak megbír inni, de étkezni nem szabad. Ha éhes, szopogathat szőlőcukrot vagy mézet.

Insulinnal élő beteg esetén a felkészítés eltérő: Reggel insulin beadása után ehetsz 1 szendvicset 1 csésze teával. Ehetsz tízórait, ebéd előtti insulin beadása után ehetsz egy tányér húsvest, 1db főthúst és 2 db főtt burgonyát. A nap többi részében étkezni nem szabad, az esti rövidhatású insulint ne add be, és a hosszúhatású insulinnak is csak a felét. Folyamatos vércukor ellenőrzés szükséges!

Cukorbetegsége miatt szedett gyógyszereket, insulint a vizsgálat utáni első étkezéshez időzítve folytassa! A hashajtás miatti irritáció miatt a végbél bőrvédelme ajánlatos (pl. Sudocrem vagy Neogranormon kenőcs)

Hogyan történik a vizsgálat?


A vizsgálat hanyatt- vagy oldaltfekvő testhelyzetben történik, általában bódító- fájdalomcsillapító injekció adását követően, majd oxigén saturáció mérés. A végbélen keresztül egy hajlékony optikai műszert vezetünk végig a vastagbél egész hosszában. A megfelelő tájékozódáshoz az eszközön keresztül levegő befúvása és vízzel történő öblítés is szükséges. A levegő befúvása székelési ingert, görcsöket és puffadásérzést okozhat. Előfordulhat, hogy a vizsgálat során megkérjük testhelyzete megváltoztatására, ebben az aszisztensnő is segíteni fogja. Elváltozások észlelése esetén szövetminta vétele, polypok esetén azok eltávolítása is indokolt lehet. Amennyiben Ön elmúlt 50 éves, a vizsgálat előtti héten laborvizsgálatok is ajánlottak (vérkép, PTR, aPTI) mert a polypok előfordulása 50 év felett nagyon gyakori, és biztonságos eltávolításukhoz ezen eredményeket ismernünk kell. A vizsgálat várhatóan 15-60 percig tart.

Mi a teendő a vizsgálat után?

Ha bódító injekciót kapott, aznap nem vezethet gépjárművet a reakcióképesség csökkenése, reflexek romlása miatt, ezért minden esetben ajánljuk, hogy kísérővel érkezzen a vizsgálatra. A vizsgálatot követő 2-3 órában csak folyadékot fogyasszon, azt követően panaszmentesség esetén már étkezhet, folytathatja szokásos napi tevékenységét.

Milyen szövődmények lehetségesek?

Mint minden beavatkozásnak, a vastagbéltükrözésnek is lehet szövődménye, azonban ez nagyon ritka. Előfordulhat az érzéstelenítőszer, illetve a nyugtató iránti túlérzékenység, műszer okozta sérülés, szövettani mintavételt vagy polyp levételét követően jelentkező vérzés vagy a tápcsatorna falának



SIKLÓSI KÓRHÁZ NONPROFIT KFT

sérülése. Rendkívül ritka esetben a szövődmények ellátása érdekében sürgős műtét is szükségessé válhat. Amennyiben a vizsgálat után több órával is hasi fájdalmat, görcsöket észlelné, értesítse vizsgáló orvosát vagy ügyeleti időben az ügyeletet orvost. Mintavétel vagy polyp levétele után széklete néhány csepp vért tartalmazhat, ennél nagyobb mennyiség ürítése esetén kontroll vizsgálat vagy a területileg illetékes Sürgősségi Betegellátó helyet kell felkeresni!

Amennyiben ezen kívül bármilyen kérdése lenne, további felvilágosítás céljából forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz!

Kérjük, hogy a következő kérdések megválaszolása után írja alá a nyilatkozatot!

Kérjük aláhúzással válaszoljon az alábbi kérdésekre:

Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről?

Nem Igen Ha igen, ezekre a gyógyszerre:

Tud-e vérzékenységről

Nem Igen

Van-e epilepsziája?

Nem Igen

Fennáll-e Önnél terhesség?

Nem Igen

Van-e zöldhályogja?

Nem Igen

Van-e beültetett szívritmus-szabályozója?

Nem Igen

Van-e egyéb említésre méltó betegsége?

Nem Igen Ha igen, ezek a betegségek:

Szed-e véralvadás gátló gyógyszert?

Nem Igen Ha igen, ez a gyógyszer:

Beleegyző nyilatkozat

Alulírott.....(név).....(születési név)

.....(születésidő).....(TAJ).....(lakcím)

ennek a nyilatkozatnak az aláírásával tanúsítom, hogy:

- A betegtájékoztatót elolvastam.
- Ismertették velem, hogy a beavatkozás következményeként szövődmények léphetnek fel, ritkán orvosi kezelést is igénylő állapot alakulhat ki.
- A beavatkozással kapcsolatos kérdéseimre választ kaptam.
- A vizsgálat elutasításának lehetséges egészségügyi következményeiről tájékoztattak.
- Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vizsgálatot visszautasítom, kezelőorvosomat nem terheli felelősség az emiatt fellépő káros következményekért, illetve betegségeim kedvezőtlen alakulásáért.

A fenti tájékoztatás alapján, kellő mérlegelés után, a vizsgálatba, illetve az esetleges szövődmények kezelésébe

beleegyzem / nem egyezem bele

(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

Siklós, 20..... év hónap nap

.....
beteg vagy törvényes képviselője

.....
a beteget tájékoztató orvos

.....
endoszkópos szakasszisztens